





Formulation

Chlorure de Calcium, Chlorure de Potassium, Chlorure de Sodium,
Sulfate de Magnésium anhydre, Phosphate

Potassium	15.0 %
Sodium	10.2 %
Calcium	5.3 %
Magnésium	4.1 %
Phosphore	2.0 %
BACA	Négatif

Mode d'emploi

1 à 2 sachets dans 20L d'eau.

Application

Drenchage début de lactation,
Vache couchée, Rumen creux
et/ou dur

Conditionnement

Sachets de 500g
Seaux de 5Kg



Formulation

Chlorure de Magnésium, Chlorure de Calcium, Chlorure de Potassium, Chlorure de Sodium, Propylèneglycol, Phosphate disodique, Sulfate de Magnésium anhydre

Potassium	2.8 %
Calcium	2.0 %
Magnésium	1.5 %
Sodium	1.5 %
Phosphore	0.8 %
BACA	Négatif

Mode d'emploi

500 ml, à répéter toutes les 12h pendant 2 jours.

Application

Non délivrance, métrite, vache couchée, relais drenchage.

Conditionnement

Bidon 2 L
Flacon 500 ml



Formulation

Chlorure de calcium anhydre, huile de colza, phosphate dicalcique, stéarate de magnésium, Extrait sec de raisin : 4 125 mg/kg, Calcium 29 %, Sodium 0.4%, Phosphore 0.1%, Magnesium 0.1%

Mode d'emploi

2 bolus, à répéter à 12 h.

Application

Prévention du risque d'hypocalcémie

Conditionnement

boîte de 12 bolus de 90g - ensachés par 2 soit 6 doses

NOUVEAU

* Ne pas diffuser - notice interne



Formulation

Chlorure de Magnésium, Chlorure de Potassium, Propylèneglycol

Potassium	14 %
Magnésium	1.9 %
Sodium	0.1 %
BACA	Négatif

Mode d'emploi

500 ml, à répéter toutes les 12h pendant 2 jours. Intercaler avec C Ionik

Application

Hypokaliémie, Hyperglycémie, Syndrome digestif

Conditionnement

Bidon 2 L
Flacon 500 ml



Formulation

Sorbitol, Dextrose, Maltodextrine, Scutellaire

Protéine brute.....	23.0 %
Matières grasses brutes.....	9.5 %
3a315 Niacinamide	150 000 mg / Kg
3a700 Vitamine E	20 000 mg / Kg
3a841 D-pantothénate de Calcium	2 500 mg / Kg
3a316 Acide Folique	60 mg / Kg
Vitamine B12	1,5 mg / Kg
3b605 Zinc (Sulfate de Zinc monohydraté)	12 000 mg / Kg
3b301 Cobalt (Acétate de Cobalt (II) tétrahydraté)	100 mg / Kg
3b811 Sélénium (Sélenométhionine)	50 mg / Kg

Mode d'emploi

1 sachet par jour pendant 3 jours

Application

Cetose I et II, BOH élevés

Conditionnement

Sachets de 100g



Formulation

Sorbitol, bicarbonate de sodium, oxyde de Magnésium, maltodextrine, stéarate de magnésium, Scutellaire.

3b301 Cobalt (Acétate de cobalt (II) tétrahydraté)	99
3b605 Zinc (Sulfate de zinc monohydraté)	12 000
3b811 Sélénium (Levure sélénée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée)	49
3a335 Vitamine B12	3
3a700 Vitamin E	50 000
3a841 D-pantothénate de calcium	2 500
3a316 Acide folique	60
3a315 Niacinamide	150 000

Mode d'emploi

1 bolus par jour pendant 3 jours /
ou relais après C TOSE poudre

Application

Cetose I et II, BOH élevés

Conditionnement

boite de 12 bolus de 100g - ensaché individuellement



Aliment complémentaire pour vaches laitières



Formulation

Sorbitol, Dextrose, Maltodextrine, Scutellaire

Protéines brutes	21.5 %
3a700 Vitamine E	20 000 mg / Kg
3a315 Niacinamide	150 000 mg / Kg

Mode d'emploi

100g par jour pendant 3 jours

Application

«Hépatovétro prescrit»
au troupeau

Conditionnement

Seaux de 5 Kg



Formulation

Sulfate de Magnésium anhydre, Sels de Sodium et de Calcium d'acide malique,
Levures (100g / Kg), Bicarbonate de Sodium

Protéine brute	44.9 %
Sodium	3.0 %
Magnésium	2.1 %
3a820 Vitamine B1 (Chlorhydrate de thiamine)	300 mg / Kg
3a890 Chlorure de choline	60 000 mg / Kg
Vitamine B12	300 mg / Kg
3a841 D-pantothénate de calcium	850 mg / Kg
3b301 Cobalt (Acétate de cobalt (II) tétrahydraté)	60 mg / Kg
3b605 Zinc (Sulfate de zinc monohydraté)	7 000 mg / Kg
3c301 DL Méthionine	200 000 mg / Kg
3c322 Monochlorhydrate de L-Lysine	244 689 mg / Kg

Mode d'emploi

Vache : 125g / jour pendant 2 jours ou
un sachet dans drenchage

Veau : 50g / jour pendant 5 jours

Application

Rumen à l'arrêt,
Dysfonctionnement ruminal,
Veaux et génisses «moches» au
sevrage

Conditionnement

Sachets de 250g



Formulation

Sorbitol, oxyde de magnésium, mélange de sels de sodium d'acides organiques et de sels de calcium d'acides organique, levures inactivées, stéarate de magnésium,

3b303 Cobalt (Hydroxyde de carbonate de cobalt (II) monohydraté (2:3))	78
3b603 Zinc (oxyde de zinc)	8 800
3a335 Vitamine B12	300
3a820 Vitamine B1	300
3a841 D-pantothénate de calcium (vitamine B5)	840
3a890 Chlorure de choline	60 000
3c322 Monochlorhydrate de L-lysine	240 000
3c301 DL-méthionine	200 000

Mode d'emploi

1 bolus, à répéter toutes les 12 h pendant 2 jours / ou relais après C RUMIBOOST poudre

Application

Rumen à l'arrêt,
Dysfonctionnement ruminal,
Veaux et génisses «moches» au sevrage

Conditionnement

boîte de 12 bolus - ensaché individuellement

NOUVEAU

* Ne pas diffuser - notice interne



Formulation

Monopropylène Glycol (1.2 Propane diol) : 600g / L, Glycerol : 200g / L
3a314 Niacine : 20g/L

Mode d'emploi

300 à 800 ml par jour

Application

Cétose
Aide au début de lactation

Conditionnement

Bidons de 5 et 20 L
Futs de 200 L



Formulation

Remoulage de blé, Carbonate de calcium, Fénugrec, Matière grasse de colza, Chlorure de sodium, scutellaire.

Calcium : 13% / Sodium : 1% / Soufre : 0.8% / Phosphore : 0.3% / Magnésium : 0.3% / Cendres insolubles : 3.2%

Vitamine A totale : 4 000 000 UI/Kg / Cuivre total : 15 000 mg/Kg / Zinc total : 19 500 mg/Kg

Sélénium total : 250 mg/Kg / Iode total : 2 500 mg/Kg

3a672a Vitamine A	
3a671 Vitamine D3	200 000 UI
3a700 Vitamine E	15 000 UI
3a160a Béta-carotène	500 mg
3B202 Iode (iodate de calcium anhydre	2500 mg
3b405 Cuivre (Sulfate de cuivre(II) pentahydraté)	7 500 mg
3b413 Cuivre (Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté)	7 500 mg
3b603 Zinc (Oxyde de zinc)	7 500 mg
3b606 Zinc (Chélate de Zinc et d'acides amines hydraté)	4 950 mg
3b607 Zinc (Chélate de Zinc et de glycine hydraté)	7 500 mg
3b304 Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))	20 mg
3b801 Sélénium (Sélénite de sodium)	150 mg
3b812 Sélénium (Levure sélénée <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inactivée)	80 mg
3b818 Sélénium (L-Sélénométhionine de Zinc)	19.8 mg
Substances aromatiques :	
2b485 Extrait sec de raisin	1 500 mg
2b163-ex Extrait de Curcuma	160 mg

Mode d'emploi

50g / jour pendant 10 jours ou
80g 1x / semaine pendant le
tarissement

Application

Carences marquées,
Prévention avant vêlage,
Mise à l'herbe

Conditionnement

Seaux de 20 Kg

NOUVEAU

* Ne pas diffuser - notice interne



Formulation

Magnésium.....	2.5 %
Calcium	0.6 %
Sodium	0.3 %
Phosphore	0.0 %
3b202 Iode (Iodate de Calcium)	28 992.0 mg / Kg
3b303 Cobalt (Carbonate hydroxyde (2:3) de Cobalt (II) monohydraté)	4 472.0 mg / Kg
3b404 Cuivre (Oxyde de Cuivre (II))	60 039.0 mg / Kg
3b502 Manganèse (Oxyde de Manganèse)	53 399.8 mg / Kg
3b603 Zinc (Oxyde de Zinc)	163 013.5 mg / Kg
3b801 Sélénium (Sélénite de Sodium)	3 330.6 mg / Kg
3a672a Vitamine A	20 000 000.0 UI / Kg
3a700 Vitamine E	100 003.3 mg / Kg

Mode d'emploi

1 bolus par animal > 350 Kg

Application

Carences marquées,
Prévention avant vêlage,
Mise à l'herbe

Conditionnement

Boîtes de 20 bolus - poids net bolus : 100g
(lance bolus fourni)



Formulation

E8 Sélénium s/f sélénite de Sodium : 17 456 mg / Kg

Mode d'emploi

1 pastille à la naissance,
au moment intervention,

Application

Détresse respiratoire,
Echec transfert colostral,
Renforce l'immunité

Conditionnement

Pots de 25 pastilles - Poids net pastille : 2,52g



Formulation

3b201 Iode s/f iodure de Potassium : 110 630 mg / Kg

Mode d'emploi

1 pastille à la naissance,
au moment intervention,
Renouveler à J5

Application

Détresse respiratoire,
Thermorégulation,
Anti-infectieux, Anti-fongique,
Renforce l'immunité

Conditionnement

Pots de 25 pastilles - Poids net pastille : 2,26g



Formulation

Phosphate dicalcique, colostrum bovin standardisé et lyophilisé, concentré de jus de melon lyophilisé.

3a300 Vitamine C s/f acide L-ascorbique : 37 000 mg / Kg

Mode d'emploi

J1 : 2 pastilles matin et soir

J2 et + : 1 pastille matin et soir

Application

Diarrhée

Conditionnement

Pots de 30 pastilles - Poids net pastille : 3g



Formulation

Lait écrémé, Sucre, Lactoserum, Huile de Coprah, Caséine de lait, Poudre de Colostrum.

Protéine brute	27.5 %
Matières grasses brutes	17.0 %
3a672a Vitamine A	24 325 UI/Kg
E671 Vitamine D3	7 785 UI/Kg
3a700 Vitamine E	195 mg/Kg
3b103 Fer (Sulfate de Fer (II) monohydraté)	54 mg/Kg
3b405 Cuivre (Sulfate de Cuivre pentahydraté)	8 mg/Kg
3b603 Zinc (Oxyde de Zinc)	39 mg/Kg
3b503 Manganèse (Sulfate manganoux monohydraté)	41 mg/Kg
3b202 Iode (Iodate de Calcium anhydre)	0.8 mg/Kg
E8 Sélénium (Sélénite de Sodium)	0.3 mg/Kg
4b1700i Bacillus licheniformis DSM5749 + Bacillus subtilis DSM5750	1 MUFC (10 ⁹)

Mode d'emploi

1 sachet dans 1,6 L d'eau à 40°C

Application

Absence de colostrum maternel,
Apport en énergie à la naissance

Conditionnement

Boîtes de 10 sachets de 300g



Formulation

Propylèneglycol, Scutellaire, Sel de Sodium de l'acide benzoïque, Huile de tournesol, Huile de lin, Produits dérivés de levures.

3a672b Vitamine A (Palmitate de rétinol)	1 100 000 UI / Kg
3a671 Vitamine D3	180 000 UI / Kg
3a700 Vitamine E	30 000 mg / Kg
3b413 Cuivre (Chélate de Cuivre (II) et de Glycine hydraté)	1 000 mg / Kg
3b607 Zinc (Chélate de Zinc et de Glycine hydraté)	500 mg / Kg
3b201 Iode (Iodure de Potassium)	730 mg / Kg
3b801 Sélénium (Sélénite de Sodium)	30 mg / Kg

Mode d'emploi

1 seringue par veau

1/2 seringue par agneau, chevreau

Application

Renforce l'immunité,
Nursing

Conditionnement

Seaux de 40 seringues - Volume net seringue : 15 ml



Formulation

3a671 Vitamine D3 s/f cholécalciférol	114 285 UI / Kg
3a700 Vitamine E s/f DL-alpha-tocopheryl acétate	157 140 UI / Kg
E5 Manganèse s/f Sulfate de Manganèse	42 240 mg / Kg

Mode d'emploi

**1 pastille par jour pendant 3 jours
+ kinésithérapie**

Application

**Arque,
Bouleture**

Conditionnement

Pots de 9 pastilles - Poids net pastille : 3,5g



Formulation

Charbon végétal, Propylèneglycol, Sorbitol, Sel de sodium de l'acide benzoïque,	
3a672b Vitamine A (Palmitate de rétinol)	550 000 UI
3a700 Vitamine E	2 700 mg
3b607 Zinc (Chélate de Zinc et de glycine hydraté)	4 000 mg
3b201 Iode (Iodure de potassium)	350 mg
3b801 Sélénium (Sélénite de sodium)	18 mg
E321 Butylhydroxytoluène (BHT)	21 mg
1m558i Bentonite	250 000 mg

Mode d'emploi

30 ml / veau ou poulain / jour pendant 2 - 3 jours

Application

- pansement intestinal
- diarrhée hémorragique

Conditionnement

boîte de 12 seringues de 60 mL



N'hésitez pas à nous contacter



CANEVAS

Nutrition - Conduite de Troupeau - Pédicure Bovins

CONTACTS

SERVICE NUTRITION / CONDUITE DE TROUPEAU : 06 07 04 67 42 - canevas53@gmail.com